Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna
Quad. Studi Nat. Romagna, 27: 261 - 262 dicembre 2008 ISSN 1123-6787

Segnalazioni faunistiche n. ~~88 - 89~~ 92 - 93

92
~~88~~ - ***Penestoglossa dardoinella*** (Millière, 1865) (Lepidoptera Psychidae)

Fiumi G. & Camporesi S., 1988 - I Macrolepidotteri, La Romagna naturale, 1, *Amministrazione Provinciale Forlì*: 264 pp.

Reperti: Ravenna, Mezzano, Bacini ex zuccherificio, 1 maschio il 12.VIII.2008 giunto alla luce, in prossimità di uno stagno; determinato da G. Fiumi.
Primo ritrovamento romagnolo in territorio di pianura, in ambiente umido non costiero.

Osservazioni: La specie è diffusa in Europa meridionale in alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in Africa nord occidentale (Marocco e Tunisia), nonchè in Croazia, Bulgaria e Grecia. In Italia fu citata per Lombardia, Liguria, Romagna, Toscana, Sardegna e Sicilia da Mariani (1940-1941, Giornale di Scienze Naturali ed Economiche: 204); viene successivamente segnalata in varie regioni meridionali (Parenzan, 1977, Entomologica: 235) , (Scalercio & Sciarretta, 2005, Boll. Soc. Entom. It.). L'habitat più comune della specie in Italia meridionale, ed in cui è particolarmente abbondante, è quello costiero oppure alla foce di fiumi. In Romagna le scarse segnalazioni compiute fino ad oggi sono legate invece ad ambienti collinari; infatti si trovano segnalazioni nel "Repertorio" di Pietro Zangheri per: Bosco di Ladino (FC) (Zangheri, 1923; 1969); Predappio (FC) (Zangheri, 1969); Badia della Valle (FI) (Usvelli, 2002). La presente segnalazione viene per la prima volta da una località della bassa pianura ravennate, in un habitat distante una quindicina di Km dalla costa, nelle immediate vicinanze di uno stagno.

Ilvio Bendazzi
e-mail: i.bendazzi@alice.it

Giorgio Pezzi
e-mail: grgpzz@libero.it

93

~~**89**~~ **-** ***Circaetus gallicus*** (Gmelin, 1788) (Aves Accipitriformes Accipitridae)
Amori et al., 1993. Vertebrata. In: Minelli, Ruffo & La Posta (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 110: 49.

Reperti: Borgo Maggiore**,** Faetano, Domagnano, Torraccia, Chiesanuova, Acquaviva (Repubblica di San Marino), numerosi avvistamenti di individui singoli e in coppia (5.VI.2008; 17.VII. 2008; 18.VII.2008; 20.VII.2008; 21.VII.2008; 22.VII.2008; 23.VII.2008; 24.VIII.2008; 27.VIII.2008) in ambiente collinare calanchivo alternato a zone boscate a roverella, macchie arbustate, radure e coltivi (200-400 m s.l.m.). Documentazione video-fotografica presso il Centro Naturalistico Sammarinese.

Osservazioni: *Circaetus gallicus*, specie monotipica a distribuzione paleartico-orientale, rara e localizzata nel basso Mediterraneo ed in decremento numerico con contrazione di areale in Europa, in Italia è migratrice nidificante (estiva) più frequente ma non uniformemente distribuita nelle Alpi occidentali, nelle Prealpi centro-orientali, nella Maremma tosco-laziale e, con ampi vuoti, sulla dorsale appenninica, localmente in incremento (cfr. Cattaneo G. & Petretti F., 1992. Biancone, *Circaetus gallicus*. In: Brichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N. (a cura di), Fauna d'Italia. XXIX, Aves. I - *Calderini*, Bologna.; Brichetti P. & Fracasso G., 2003. Ornitologia Italiana. Vol. I - Gaviidae-Falconidae. *Alberto Perdisa Editore*, Bologna: 326-329).
Pur non avendone accertata la nidificazione, si tratta della prima segnalazione di presenza stabile in periodo riproduttivo per il territorio della Repubblica di San Marino (e per le aree immediatamente vicine). Nelle aree limitrofe delle province di Rimini e Forlì-Cesena la specie non risulta nidificante (cfr. Gellini S., Ceccarelli P.P. (a cura di), 2000. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna (1995-1997). Amministrazioni provinciali di Forlì-Cesena e Ravenna). In provincia di Pesaro-Urbino *Circaetus gallicus* non risultava nidificante almeno sino a tempi recenti (cfr. Pandolfi M. & Giacchini P., 1995. Avifauna della provincia di Pesaro e Urbino. Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino). Solo in questi ultimi anni il biancone ha cominciato a nidificare in varie zone della Provincia di Pesaro-Urbino e del Montefeltro (in verbis).

Sandro Casali
Centro Naturalistico Sammarinese (www.centronaturalistico.sm)
via Valdes De Carli, 21
47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino
e-mail: centronaturalistico@omniway.sm